

Será que devo tomar aspirina.

PARA A MINHA PROTEÇÃO E A DO MEU BEBÊ?

Use esta ferramenta para conversar com o seu profissional sobre o risco de pré-eclâmpsia e o uso de aspirina em baixa dose.

MARQUE ABAIXO

SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO

JÁ DISSERAM A VOCÊ QUE TEM ALGUM DOS SEGUINTE SINTOMAS?*

Pré-eclâmpsia ("toxemia") em uma gravidez anterior
Gêmeos ou trigêmeos na gravidez atual
Hipertensão (pressão alta)
Diabetes mellitus (tipo 1 ou 2)
Doença renal
Doença autoimune (lúpus, artrite reumatoide etc.)

SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO

Sua mãe/irmã teve pré-eclâmpsia ("toxemia") durante a gravidez?
Você tem 35 anos ou mais?
Você se identifica como negra ou tem ascendência africana ou afro-caribenha?***
Será seu primeiro filho?
Essa gravidez foi concebida com fertilização in vitro (FIV)?
Você passa por dificuldades financeiras?***

SE VOCÊ JÁ TEM FILHOS:

SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO

Seu filho mais novo tem 10 anos ou mais?
Algum filho pesava menos de 5,5 lb (2,5 kg) no momento do nascimento?
Você teve alguma complicação em uma gravidez anterior?

*Cada um desses itens será associado a uma resposta Sim/Não.

**Pessoas que se identificam como negras passam por mais estresse devido à maior exposição ao racismo.

***Pessoas que enfrentam dificuldades financeiras podem sofrer mais estresse e ter menos acesso à saúde.

O QUE VOCÊ ACHA OU SABE SOBRE O USO
DE ASPIRINA NA GRAVIDEZ?

QUAL É SUA PREOCUPAÇÃO EM USAR ASPIRINA
DURANTE A GRAVIDEZ?