

Стоит ли мне принимать аспирин.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЕГО МАЛЫША?

Используйте этот инструмент, чтобы обсудить со своим врачом риск преэклампсии и применение низкой дозы аспирина.

ОТМЕТЬТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ВАРИАНТ НИЖЕ

ДА НЕТ
ДА НЕТ
ДА НЕТ
ДА НЕТ
ДА НЕТ
ДА НЕТ

СООБЩАЛ ЛИ ВАМ ВРАЧ О НАЛИЧИИ У ВАС СЛЕДУЮЩИХ
СОСТОЯНИЙ?*

Преэклампсия («токсемия») во время предыдущей беременности
Двойня или тройня при текущей беременности
Гипертония (повышенное артериальное давление)
Сахарный диабет (1-го или 2-го типа)
Заболевание почек
Аутоиммунное заболевание (волчанка, ревматоидный артрит и др.)

ДА НЕТ
ДА НЕТ
ДА НЕТ

ДА НЕТ
ДА НЕТ

ДА НЕТ

У вашей матери или сестры была преэклампсия («токсемия») во время беременности?
Вам 35 лет или больше?
Относите ли вы себя к чернокожим или имеете африканское либо афро-карибское происхождение?***
Это будет ваш первый ребенок?
Наступила ли эта беременность в результате экстракорпорального оплодотворения (in vitro fertilization, IVF)?
Испытываете ли вы финансовые трудности?***

ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ДЕТИ:

ДА НЕТ
ДА НЕТ
ДА НЕТ

Вашему младшему ребенку 10 лет или больше?
Был ли вес какого-либо из ваших детей при рождении менее 2,5 кг (5,5 фунта)?
Были ли у вас осложнения во время предыдущей беременности?

*На каждый из этих вопросов нужно ответить «Да» или «Нет».

**Лица, относящие себя к чернокожему населению, могут испытывать более высокий уровень стресса из-за повышенной подверженности расизму.

*** Лица, испытывающие финансовые трудности, могут сталкиваться с повышенным стрессом и ограниченным доступом к медицинской помощи.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ИЛИ ЗНАЕТЕ О ПРИМЕНЕНИИ
АСПИРИНА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?



ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ В ПРИЕМЕ АСПИРИНА
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?

