

Чи слід мені приймати аспірин

ЩОБ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА СВОЮ ДИТИНУ?

Використовуйте цю анкету, щоб обговорити з лікарем ризик розвитку прееклампсії та застосування невеликих доз аспірину.

ПОЗНАЧТЕ СВОЮ
ВІДПОВІДЬ

ЧИ ВАМ КОЛИ-НЕБУДЬ КАЗАЛИ, ЩО У ВАС Є ЩОСЬ
ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНОГО НИЖЧЕ?*

ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ

Прееклампсія («токсикоз») під час попередньої вагітності
Двійня або трійня під час поточної вагітності
Гіпертонія (підвищений кров'яний тиск)
Цукровий діабет (1-го або 2-го типу)
Захворювання нирок
Аутоімунні захворювання (вовчак, ревматоїдний артрит тощо)

ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ

Чи була у вашої матері/сестри прееклампсія («токсикоз») під час вагітності?
Вам 35 років або більше?
Ви ідентифікуєте себе як чорношкіру особу або маєте африканське чи афро-карибське походження?**
Це буде ваша перша дитина?
Чи була ця дитина зачата за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ)?
Чи маєте ви фінансові труднощі?***

ЯКЩО ВИ ВЖЕ МАЄТЕ ДІТЕЙ

ТАК НІ
ТАК НІ
ТАК НІ

Вашій наймолодшій дитині 10 років або більше?
Чи були серед раніше народжених дітей такі, чия вага при народженні була меншою за 2,5 кг (5,5 фунтів)?
Чи були у вас ускладнення під час попередньої вагітності?

* Кожен із цих пунктів буде пов'язаний із відповіддю «Так» або «Ні».

** Особи, які ідентифікують себе як чорношкірих, відчувають більший стрес через частіші прояви расизму по відношенню до них.

*** Особи, які зазнають фінансових труднощів, можуть відчувати підвищений стрес і мати обмежений доступ до медичної допомоги.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ АБО ЗНАЄТЕ ПРО
ЗАСТОСУВАННЯ АСПІРИНУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ?



ЧИ Є У ВАС СУМНІВИ АБО ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО
ВЖИВАННЯ АСПІРИНУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ?

