

Tôi có nên dùng Aspirin...

ĐỂ BẢO VỆ TÔI VÀ EM BÉ KHÔNG?

Hãy sử dụng công cụ này để trao đổi với bác sĩ về nguy cơ tiền sản giật và việc sử dụng aspirin liều thấp.

VUI LÒNG ĐÁNH
DẤU BÊN DƯỚI

QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO LÀ MẮC BẤT KỲ BỆNH NÀO
SAU ĐÂY CHƯA?*

CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG

Tiền sản giật ("nhiễm độc thai nghén") trong lần mang thai trước
Sinh đôi hoặc sinh ba trong lần mang thai hiện tại
Tăng huyết áp
Đái tháo đường (loại 1 hoặc loại 2)
Bệnh thận
Rối loạn tự miễn (lupus, viêm khớp dạng thấp, v.v.)

CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG

Mẹ/chị/em gái của quý vị có bị tiền sản giật ("nhiễm độc thai nghén") khi mang thai không?
Quý vị từ 35 tuổi trở lên?
Quý vị tự nhận mình là người da đen hoặc có tổ tiên gốc Phi hoặc Caribe không? **
Đây có phải là con đầu lòng của quý vị không?
Thai kỳ này được thụ tinh trong ống nghiệm (vitro fertilization, IVF) phải không?
Quý vị có gặp khó khăn về tài chính không? ***

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ TỪNG CÓ CON TRƯỚC ĐÂY:

CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG
CÓ KHÔNG

Người con nhỏ tuổi nhất của quý vị đã 10 tuổi trở lên chưa?
Có người con nào trước đây cân nặng dưới 5.5 lbs (2,5 kg) khi sinh không?
Quý vị có gặp biến chứng nào trong lần mang thai trước không?

*Quý vị sẽ cần trả lời Có/Không cho từng mục này.

**Những người tự nhận mình là người da đen phải chịu nhiều căng thẳng hơn do thường xuyên tiếp xúc với nạn phân biệt chủng tộc.

*** Những người gặp khó khăn về tài chính có thể phải chịu nhiều căng thẳng và khó tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn.

QUÝ VỊ NGHĨ GÌ HOẶC BIẾT GÌ VỀ VIỆC SỬ DỤNG
ASPIRIN TRONG THAI KỲ?

ĐIỀU GÌ KHIẾN QUÝ VỊ LO LẮNG KHI SỬ DỤNG
ASPIRIN TRONG THAI KỲ?